




**Overtake<sup>®</sup>**  
Herbicide

Los geht's!


# Produktprofil von OVERTAKE

OVERTAKE	Nachauflauf - Herbizid im Rasen
Wirkstoffe	Fluroxypyr 100 g/l (FLU) und Florasulam 2,45 g/l (FLO)
Registernummer	4392 - 0
Formulierung	SE (Suspensionsemulsion)
HRAC Gruppe	Code 4 (synthetisches Auxin) und Code 2 (ALS Inhibitor)
Wirkmechanismus	FLU beeinflusst das Pflanzenwachstum der Unkräuter FLO hemmt die Proteinbiosynthese bei den Unkräutern
Kultur	Golf- und Sportrasen, Zierrasen (Professionell)
Schadorganismen	Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter
Aufwandmenge im Rasen	1,9 l/ha in 200 - 400 l Wasser/ha ausgenommen Ansaatjahr 1,0 l/ha in 200 - 400 l Wasser/ha im Ansaatjahr
Zahl Applikationen	Max. 1 Anwendung/Jahr
Einsatzzeitpunkt	Ab BBCH 12 nach dem Auflaufen der Unkräuter im Frühjahr, sobald die Unkräuter aktiv sind (Temperaturen > 10°C)



# Aufnahme und Verteilung

- Aufnahme erfolgt durch die Blätter
- Systemische Verteilung akropetal und basipetal
- Keine Aufnahme über die Wurzel
- Wirkstoffe reichern sich nicht im Boden an
- Optimale Wirkung im Frühjahr, wenn die Unkräuter aktiv und noch klein sind
- Temperaturen  $> 10\text{ °C}$



# Gut bekämpfbare Unkräuter

## Sehr gut bekämpfbar (95-100% Wirkung)

Vogelmiere (*Stellaria media*)



Ehrenpreis (*Veronica filiformis*)



Rotklee (*Trifolium*)



Hornkraut (*Cerastium spec.*)



## Gut bekämpfbar (85 -94,5% Wirkung)

Gänseblume (*Bellis perennis*)



Weißklee (*Trifolium repens*)



Butterblume (*Ranunculus repens*)



Löwenzahn (*Taraxacum officinale*)



# Weniger gut bekämpfbare Unkräuter

Weniger gut bekämpfbar ( < 70% Wirkung )

Hirtentäschel (*Pastella bursa-pastoris*)



Spitzwegerich (*Plantago lanceolata*)



Knöterich (*Polygonum spp.*)



Schafgarbe (*Achillea millefolium*)




# LOS GEHT'S Applikationszeitpunkt



## Düngung

Düngung beeinflusst nur das Rasenwachstum

Der Rasen ist robuster, kann den Stress im Sommer besser überstehen



März / April / Mai



# LOS GEHT's Applikationshinweise

- Im Frühjahr applizieren, wenn die Unkräuter noch klein und empfindlicher sind
- Keine Applikation in gestresste Bestände (Hitze, Trockenheit, Frost)
- Keine Anwendung in nasse Bestände
- Der optimale Applikationszeitpunkt hat großen Einfluß auf die Wirksamkeit
- Bis drei Tage vor und nach der Applikation sollte nicht gemäht werden
- Der Belag ist nach 1 Stunde regenfest – vorher nicht beregnen!
- Applikation bei Wasseraufwandmengen von 200 l/ha
- Verwendung von abdriftarmen Düsen (025-er oder 04-er Düsen)

# OVERTAKE spart Zeit!

## Vorteile für Sie

- Gute Wirkung auch mit geringeren Wasseraufwandmengen von 200 l/ha
- Weniger Tankbefüllungen nötig
- Gute Mischbarkeit - erlaubt Tankmischungen

## Vorteile für Ihren Rasen

- Im Frühjahr steht der Rasen in Konkurrenz mit den Unkräutern - Licht, Wasser, Nährstoffe und Platz
- Frühzeitiger Einsatz von Overtake unterstützt das Wachstum ihres Rasens
- Overtake ist verträglich im Rasen

